


正しい薬の使い方

STOP 薬物乱用



(監修)川崎幸病院 薬剤師 橋本 理恵子

川崎幸幸病院 薬剤師監修!

中学生・高校生向け!薬物乱用防止教育に使用できる演用スライド(40ページ)です。違法薬物だけでなく、処方されるお薬や市販薬依存、カフェイン中毒などの解説付き。講演会や勉強会で使えます。※無断転載・二次配布禁止

PowerPoint

正しい薬の使い方

STOP 薬物乱用

(監修)川崎幸病院 薬剤師 橋本 理恵子

どんな時にどんな薬を使う?

① 風邪をひいたとき

飲み薬 塗り薬

どんな時にどんな薬を使う?

① 風邪をひいたとき

飲み薬 塗り薬

薬の選び方

薬にはいろいろな種類があり、症状にあわせて処方されます。

風邪薬1つにとっても、熱があるか、のどが痛いか、鼻水がでるか……などなど、それぞれの症状に合わせた薬があります。

薬を選ぶときには**3つのポイント**を押さしましょう。

薬の選び方のポイント

- ①いつから
- ②どんな症状
- ③副作用やアレルギー

- 病院を受診したときは、3つのポイントを医師に相談し、医師・薬剤師の指示に従って薬を使いましょう。
- ドラッグストアなどで市販薬を購入する際には、3つのポイントを薬剤師へ相談し、購入しましょう。

薬の副作用

薬は必要なところで効果的に働くだけでなく、他のところにも影響をあたえることがあります。

例) かぜ薬を飲んで、鼻水は止まったけれど…とても眠くなってしまった

このような**目的以外の好ましくない作用**は「副作用」と呼ばれています。副作用が現れる原因はさまざまです。

違法薬物 LSD

・LSD

無臭・無色・無味。幻覚、幻聴、時間感覚の欠如等、強烈な幻覚作用が現れます。特に幻視作用が強く、ほんのわずかな量で、物の形が變形、巨大化して見えたり、色とりどりの光が見えたりする状態が8~12時間続きます。

俗称:アシッド、ペーパー、タブレットなど

違法薬物 覚せい剤

・覚せい剤

見かけは粉砂糖を砕いたような無色透明のかたまりで、匂いはありません。強い依存性があり、精神や身体をボロボロにし、死に至る場合もあります。

俗称:アイス、ホワイト、スピード、エス、クリスタルなど

違法薬物 シンナー・トルエン

・シンナー・トルエン

シンナーは塗料のうすめ液として使われ、有機溶剤の混合物です。幻覚や被害妄想などが現れます。脳細胞を破壊するため、大脳は萎縮し、乱用を止めても元には戻りません。大量摂取すると、呼吸中枢が麻痺し、窒息死することもあります。

